



Alta tecnología con eficiencia y respeto al medio ambiente

AVT-450[®]

USO VETERINARIO Y HIGIENE INDUSTRIAL

DESINFECTANTE BASE DE GLUTARALDEHIDO
Y CLORURO DE BENZALCONIO

PolySell[®]

Promoviendo Bioseguridad

 **DIMUNE**
LIDERES EN BIOTECNOLOGIA

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

DIMUNE S.A. San Francisco N39-145 y Avenida América, QUITO - ECUADOR

Tel: (593)22922-842 - Telefax(593)22275-927 - Email: servicioalcliente@dimune.com - WEB: www.dimune.com

Modo de Empleo

Granjas de Reproductoras Pesadas:

- Limpieza: Aplicar DETER SELL CB® en la dilución de 1:300, dejar actuar por 20 minutos y enseguida enjuagar;
- 1ª Desinfección: Aplicar en las instalaciones secas el AVT-450® en la dilución de 1:1000;
- 2ª Desinfección: Aplicar en las instalaciones secas el POLY-PHEN® en la dilución de 1:250;
- 3ª Desinfección: Pulverizar el ambiente listo, con los equipos montados el producto POLY-PHEN® en la dilución de 1:250.

Granjas de Pollo de Corte y Ponedoras:

- Limpieza: Aplicar el producto AVT-40® en la dilución de 1:1000 utilizando agua con presión (no necesita enjuagar);
- 1ª Desinfección: Aplicar en las instalaciones secas el producto AVT-450® en la dilución de 1:1000. En caso de alto desafío aplicar AVT-450® en la dilución de 1:500.
- 2ª Desinfección: Aplicar en las instalaciones secas el producto AVT-450® en la dilución de 1:1000. En caso de alto desafío aplicar POLY-PHEN® en la dilución de 1:250.

Granjas de Cerdos:

Maternidad/Sala de destete:

- Limpieza: Aplicar DETER SELL-CB® en la dilución de 1:300, dejar actuar por 20 minutos y enseguida enjuagar;
- 1ª desinfección: aplicar en las instalaciones secas el producto POLY-PHEN® en la dilución de 1:250.
- 2ª desinfección: aplicar en las instalaciones secas el producto POLY-PHEN® en la dilución de 1:250 un día antes de la entrada de la hembra en la maternidad y/o de los lechones en la sala de destete.

En caso de desafíos con *Iso spor a suis*, hacer aplicaciones con el producto POLY-PHEN® en la dilución de 1:100, en el 3º y 10º día, después del nacimiento de los lechones.

La misma dilución deberá ser utilizada en el 7º día después del alojamiento de los lechones en la sala de destete.

Engorde/terminación/gestación:

- Limpieza: Aplicar el producto DETER SELL-CB® en la dilución 1:300, dejar actuar por 20 minutos y enseguida enjuagar.
- Desinfección: Aplicar en las instalaciones secas el producto AVT-450® en la dilución de 1:1000.

Incubadoras, otros usos y en casos de enfermedades:

- Consultar un técnico especializado de POLY SELL®.

Obs: Estos programas dispensan la utilización de formol y sus derivados en la desinfección de instalaciones.



Sistema de Gestión Integrado
certificado por las normas
ISO 9001 y ISO 14001

