

CEVAC® BRON 120 L

Vacuna Activa, Liofilizada Cepa Massachusetts H120

Para la inmunización activa de pollos contra la
Bronquitis Infecciosa Aviar

COMPOSICIÓN

CEVAC® BRON 120 L contiene la cepa Massachusetts H120 del virus de la Bronquitis Infecciosa Aviar en forma activa y liofilizada. Los huevos embrionados empleados en la elaboración de la vacuna se obtienen de parvadas libres de patógenos específicos (SPF).

INDICACIONES

Para la inmunización activa de pollos sanos contra la Bronquitis Infecciosa. La vacuna puede emplearse para la vacunación inicial o la revacunación de pollos, pollitas y gallinas.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

La primovacunación puede realizarse con CEVAC® BRON 120 L por **vía ocular** o **por el método de aspersión** desde el primer día de edad. Se recomienda la revacunación por aspersión o en el agua de bebida tres a cuatro semanas posteriores a la primovacunación.

Para pollitas de reemplazo una segunda revacunación es recomendada entre las 10 y 12 semanas de edad.

EFEECTO SECUNDARIO

Esporádicamente síntomas respiratorios catarrales pueden aparecer de 4 a 6 días después de la vacunación pero desaparecen en pocos días.

ALMACENAMIENTO

Almacenar la vacuna entre +2°C y +8°C protegida de la luz.

PRESENTACIÓN

Viales de 1,000 y 2,500 dosis.