

# CEVAC® MASS L

Vacuna Activa, Liofilizada Cepa Massachusetts B48

Para la inmunización activa de pollos contra la Bronquitis Infecciosa Aviar.

## COMPOSICIÓN

CEVAC® MASS L contiene la cepa Massachusetts B48 del virus de la Bronquitis Infecciosa Aviar en forma activa y liofilizada. Los huevos embrionados empleados en la elaboración de la vacuna se obtienen de parvadas libres de patógenos específicos (SPF).

## INDICACIONES

Para la inmunización activa de pollos sanos contra la Bronquitis Infecciosa. La vacuna puede emplearse para la primovacunación o revacunación de pollos, pollitas de reemplazo y gallinas.

## ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

La primovacunación puede realizarse con CEVAC® MASS L por vía ocular o por el método de aspersión desde el primer al cuarto día de edad.

Se recomienda la revacunación tres a cuatro semanas posteriores a la primovacunación por el método de aspersión o en el agua de bebida.

Para pollitas de reemplazo, la revacunación es recomendada desde las 10 a 12 semanas de edad.

## EFECTO SECUNDARIO

Esporádicamente síntomas respiratorios catarrales puede aparecer de 4 a 6 días después de la vacunación pero desaparecen en pocos días.

## ALMACENAMIENTO

Almacenar la vacuna entre +2°C y +8°C protegida de la luz.

## PRESENTACIÓN

Viales de 1,000 y 2,500 dosis