

# CEVAC® GUMBO L

Vacuna Activa, Liofilizada

Para la inmunización activa de pollos contra la  
Enfermedad Infecciosa de la Bolsa de Fabricio (IBD)

## COMPOSICIÓN

CEVAC® GUMBO L contiene la cepa vacunal intermedia LIBDV del virus de la enfermedad de la bolsa de Fabricio en su forma activa y en presentación liofilizada.

## INDICACIONES

Para la inmunización activa de pollos sanos contra la Infección de la Bolsa de Fabricio (Enfermedad de Gumboro).

## ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

CEVAC® GUMBO L debe ser administrada en el agua de bebida. Los pollos deben ser vacunados con CEVAC® GUMBO L entre los 14 y 21 días de edad, dependiendo del nivel de anticuerpos maternos que presenten. En caso de encontrarse niveles heterogéneos entre los pollos, es recomendable llevar a cabo una primera vacunación entre los 7 y 10 días de edad.

Las pollas de reemplazo deben ser vacunadas en dos ocasiones entre los 20 y 28 días, dejando un intervalo mínimo de 6 días entre cada administración. En caso de encontrarse niveles heterogéneos de anticuerpos maternos entre las pollas, es recomendable llevar a cabo una primera vacunación entre los 14 y 16 días de edad.

La edad exacta de vacunación puede determinarse estimando el nivel de anticuerpos mediante métodos serológicos.

## ALMACENAMIENTO

Almacenar la vacuna entre +2°C y +8°C protegida de la luz.

## PRESENTACIÓN

Viales de 1,000 y 5,000 dosis.