

MAXIMUNE® 8

Vacuna inactivada, emulsionada en aceite.

Para la inmunización de pollos contra la Enfermedad de Newcastle (ND), Bronquitis Infecciosa Aviar (BI), Infección de la Bolsa de Fabricio (3 cepas) y contra Reovirus (3 cepas).

COMPOSICIÓN

MAXIMUNE® 8 es una vacuna inactivada y emulsionada en aceite que contiene tres cepas del virus de la Infección de la bolsa de Fabricio (Cepa estándar, Variante A, y Variante E) además de tres cepas de reovirus incluyendo la cepa S1133 (patotipo de tenosinovitis) la cepa 2408 (patotipo del Síndrome de mala absorción) y la cepa SS412 (serotipo distinto del tipo de reovirus S1133 y agente causal de proventriculitis y síndrome de mala absorción en pollos). **MAXIMUNE® 8** también contiene el virus responsable de la enfermedad de Newcastle cepa La Sota y las cepas Mass 41 y Mass Holland del virus de la bronquitis Infecciosa. Todos los virus incluidos en **MAXIMUNE® 8** provienen de aislamientos no clonados producidos en sustratos de embriones SPF o en bolsas de Fabricio de pollos SPF.

INDICACIONES

La vacuna esta indicada para emplearse en aves sanos de al menos 18 semanas de edad y como ayuda en la prevención de la enfermedad de Newcastle y bronquitis infecciosa (Serotipo Mass). La vacunación de reproductoras provee de anticuerpos maternos a la progenie para la prevención de la Infección de la Bolsa de Fabricio causada por cepas estándar y variantes así como contra la Tenosinovitis (artritis viral) y el Síndrome de Mala Absorción causadas por reovirus estándar y del tipo SS412. Resultados óptimos se obtienen cuando los pollos son apropiadamente primo-vacunados con una vacuna activa contra la Enfermedad de Newcastle, Infección Bursal, la Tenosinovitis y la Bronquitis Infecciosa del tipo MASS al menos cuatro semanas antes de la administración de **MAXIMUNE® 8**.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

La vacuna debe administrarse a una dosis de 0.5 mL por ave, de manera subcutánea en la parte posterior del cuello, en el tercio medio entre la cabeza y el cuerpo, en dirección contraria a la cabeza. Referirse a la etiqueta de la vacuna para ver instrucciones específicas sobre su uso y precauciones.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre +2°C y +8°C
Protegida de la luz.
No congelar.

PRESENTACIÓN

Frascos de 1,000 dosis / 500 mL.

PRECAUCIONES

Este producto contiene un adyuvante oleoso, la inyección accidental en humanos puede causar una reacción localizada seria. Busque atención Médica Especializada inmediatamente.