



*Alta tecnología con eficiencia y respeto al medio ambiente*

**POLY-PHEN<sup>®</sup>**

USO VETERINARIO Y HIGIENE INDUSTRIAL

DESINFECTANTE BASE DE FENÓLICOS  
SINTÉTICOS



Promoviendo Bioseguridad



**DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:**

DIMUNE S.A. San Francisco N39-145 y Avenida América, QUITO - ECUADOR

Tel: (593)22922-842 - Telefax(593)22275-927 - Email: [servicioalcliente@dimune.com](mailto:servicioalcliente@dimune.com) - WEB: [www.dimune.com](http://www.dimune.com)

## Modo de Empleo

### Granjas de Reproductoras Pesadas:

- Limpieza: Aplicar DETER SELL CB® en la dilución de 1:300, dejar actuar por 20 minutos y enseguida enjuagar;
- 1ª Desinfección: Aplicar en las instalaciones secas el AVT-450® en la dilución de 1:1000;
- 2ª Desinfección: Aplicar en las instalaciones secas el POLY-PHEN® en la dilución de 1:250;
- 3ª Desinfección: Pulverizar el ambiente listo, con los equipos montados, el producto POLY-PHEN® en la dilución de 1:250.

### Granjas de Pollo de Corte y Ponedoras:

- Limpieza: Aplicar el producto AVT-40® en la dilución de 1:1000 utilizando agua con presión (no necesita enjuagar);
- 1ª Desinfección: Aplicar en las instalaciones secas el producto AVT-450® en la dilución de 1:1000. En caso de alto desafío aplicar AVT-450® en la dilución de 1:500.
- 2ª Desinfección: Aplicar en las instalaciones secas el producto AVT-450® en la dilución de 1:1000. En caso de alto desafío aplicar POLY-PHEN® en la dilución de 1:250.

### Granjas de Cerdos:

#### Maternidad/Sala de destete:

- Limpieza: Aplicar DETER SELL-CB® en la dilución de 1:300, dejar actuar por 20 minutos y en seguida enjuagar;
- 1ª desinfección: aplicar en las instalaciones secas el producto POLY-PHEN® en la dilución de 1:250.
- 2ª desinfección: aplicar en las instalaciones secas el producto POLY-PHEN® en la dilución de 1:250 un día antes de la entrada de la hembra en la maternidad y/o de los lechones en la sala de destete.

En caso de desafíos con *Isospora suis*, hacer aplicaciones con el producto POLY-PHEN® en la dilución de 1:100, en el 3º y 10º día, después del nacimiento de los lechones.

La misma dilución deberá ser utilizada en el 7º día después del alojamiento de los lechones en la sala de destete.

#### Engorde/terminación/gestación:

- Limpieza: Aplicar el producto DETER SELL-CB® en la dilución 1:300, dejar actuar por 20 minutos y enseguida enjuagar.
- Desinfección: Aplicar en las instalaciones secas el producto AVT-450® en la dilución de 1:1000.

### Incubadoras, otros usos y en casos de enfermedades:

- Consultar un técnico especializado de POLY SELL®.

Obs: Estos programas dispensan la utilización de formol y sus derivados en la desinfección de instalaciones.



**Calidad  
Garantizada**

*"Eficiencia comprobada  
en el control de  
oocisto y espora"*



Sistema de Gestión Integrado  
certificado por las normas  
ISO 9001 y ISO 14001

