

VECTORMUNE® FP MG + AE

Vacuna vectorizada activa liofilizada.

Para la inmunización activa de pollos contra la Viruela Aviar, la infección con *Mycoplasma gallisepticum* y la Encefalomiелitis Infecciosa Aviar.

COMPOSICIÓN

VECTORMUNE® FP MG + AE es una vacuna elaborada con un virus de la Viruela Aviar modificado mediante ingeniería genética para emplearse en pollos. El virus de la viruela aviar ha sido genéticamente modificado para expresar antígenos protectivos clave del *Mycoplasma gallisepticum* (MG). Adicionalmente al virus vector de la viruela aviar, esta vacuna liofilizada contiene un virus vacunal convencional (activo) de la Encefalomiелitis Aviar para proteger a las aves vacunadas contra esta enfermedad.

INDICACIONES

VECTORMUNE® FP MG + AE se recomienda para la aplicación mediante punción alar de pollos sanos, susceptibles, de ocho semanas de edad o mayores, pero al menos 4 semanas antes de que las aves entren a postura.

VECTORMUNE® FP MG AE se recomienda como ayuda en la prevención de la Viruela Aviar, la infección por *Mycoplasma gallisepticum* y la Encefalomiелitis Infecciosa Aviar. Las aves que vayan a vacunarse no deben haber sido expuestas al virus de campo de la Viruela Aviar o a la vacuna contra la Viruela Aviar debido a la interferencia de la inmunidad después de la vacunación.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Punción alar: Insertar el aplicador en el pliegue del ala evitando las plumas, músculo, hueso y vasos sanguíneos (0.01 mL dosis/ave). La vacuna debe ser consumida totalmente una hora después de haberse reconstituido.

ALMACENAMIENTO

Almacenar la vacuna entre +2°C y +8°C protegida de la luz.

PRESENTACIÓN

10 Viales x 1,000 dosis con diluyente y aplicadores (punzones).



Vectormune®

SOLO PARA USO VETERINARIO

