

Vacuna contra la LHRH basada en Péptidos Sintéticos

COMPOSICIÓN	Cada dosis de 1ml contiene: Inmunógenos peptídicos LHRH 100 µg/ml (Cada uno de los péptidos P500, P667 y P607e se mezclan en la misma proporción molar) Adyuvante oleoso 0.5 ml Solución Salina 0.5 ml
--------------------	--

ESPECIE DESTINO	Cerdos
------------------------	--------

INDICACIONES	Vacuna para la eliminación del olor sexual en la carne de los cerdos machos y método alternativo a la castración quirúrgica en cerdos.
---------------------	--

ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN	La dosis es de 1ml inyectada por vía subcutánea en el cuello, detrás de la oreja. Se deben administrar dos dosis de 1ml de la vacuna a cerdos machos enteros. La primera dosis debe ser administrada a partir de las 3 semanas de edad. La segunda dosis debe ser administrada entre la 3ª y 8ª semana antes del sacrificio, con un intervalo mínimo de 4 semanas entre la primera y la segunda aplicación.
--------------------------------------	--

PRECAUCIONES GENERALES	<ol style="list-style-type: none">1. CEVA VALORA™ es únicamente para el tratamiento de cerdos saludables2. Utilice jeringas y agujas esterilizadas para aplicar la vacuna3. Para una mayor seguridad y evitar la auto-inyección accidental, utilizar equipo de aplicación específico proporcionado por Ceva.4. Antes de utilizar, agite vigorosamente la vacuna. Mantener a temperatura ambiente (20-25°C) hasta 2 horas antes de su administración.5. CEVA VALORA™ está restringida para ser usada po o bajo la dirección de un veterinario certificado.6. Se debe tener especial cuidado para evitar una autoinyección accidental. Cuando se administre, utilice jeringas con dispositivo de seguridad que incluyan un protector de aguja y un mecanismo que prevenga la operación accidental del émbolo. CEVA VALORA™ no debe ser administrada por mujeres que están o podrían estar embarazadas. En caso de autoinyección, busque atención médica inmediatamente y proporcione la MSDS (Hoja de Datos de Seguridad de Materiales) al médico. Las personas que hayan sido autoinyectadas deben evitar cualquier exposición adicional.7. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua. En caso de contacto con la piel, lave de inmediato con agua y jabón. <p>Disposición de residuos de acuerdo con la normativa nacional. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.</p>
-------------------------------	---

CONTRAINDICACIONES	No utilice en cerdos destinados para la reproducción
---------------------------	--

PERIODO DE RETIRO Ninguno, siempre y cuando el producto se haya administrado de acuerdo con las indicaciones del prospecto/instructivo.

ALMACENAMIENTO Almacene de 2 a 8°C. No congelar. Proteja de la luz.

PRESENTACIÓN Viales conteniendo 50ml (50 dosis), 100ml (100 dosis) y 200ml (200 dosis)



Fabricado por:

Ceva Santé Animale
Z.I. Très le Bois, 22600 Loudéac, Francia



Importado y Distribuido por DIMUNE S.A.

San Francisco N39-145 y Av. América (Sector Canal 4)
Quito, Ecuador
Telfs: (593) 2-275-927 / (593) 999-316-651
Email: servicioalcliente@dimune.com