



Vacuna viva liofilizada de *Salmonella* Gallinarum para la inmunización activa de aves contra la infección de *Salmonella* Gallinarum/*Salmonella* Pullorum y y como apoyo en la inmunización activa contra *Salmonella* Enteritidis

COMPOSICIÓN	Cada dosis contiene: <i>Salmonella</i> Gallinarum (Cepa 9R) $\geq 2 \times 10^{7.0}$ UFC Estabilizante c.s.p. 1 dosis
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPECIE DESTINO	Aves
------------------------	------

INDICACIONES	Para la inmunización activa de aves sanas de 4 semanas de edad, contra la infección de <i>Salmonella</i> Gallinarum/ <i>Salmonella</i> Pullorum. Esta vacuna también puede ser aplicada en aves recién nacidas para otorgarles una activa protección cruzada contra infecciones causadas por otras <i>Salmonellas</i> del grupo D, como <i>Salmonella</i> Enteritidis.
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN	Dosis: 0.2 mL La vacuna debe ser administrada por vía subcutánea. Las aves serán vacunadas, siendo recomendable la revacunación pasado un plazo no menor a 4 semanas, siendo el ideal de 6-8 semanas. La primera vacunación se puede efectuar a partir de las 4 semanas de vida. La vacuna debe ser aplicada por lo menos dos semanas antes de trasladar las aves al área de producción. La pastilla liofilizada debe ser rehidratada en el volumen apropiado de diluyente (*), como se indica: <ul style="list-style-type: none">• Extraer con una jeringa estéril un pequeño volumen del diluyente e inyectarlo en el envase de vacuna, para su reconstitución.• Agitar bien el envase, hasta que el liofilizado se encuentre hidratado.• Extraer la solución preparada del envase y reinyectarla en el diluyente. Enjuagar el envase al menos una vez.• Agitar suavemente el frasco de diluyente.• Utilizar la vacuna inmediatamente. (*). Este volumen deberá ser ajustado a la presentación de la vacuna, para administrarla con 0.2 mL por dosis. Aplicar dosis de 0.2 mL de la vacuna reconstituida por la vía subcutánea. La inyección deberá ser aplicada exactamente debajo de la piel, en la parte inferior detrás de la nuca del ave por medio de un sistema de inyección automática o manual. Las variaciones del programa de vacunación deberán ser analizadas por el médico veterinario teniendo en cuenta la evaluación de riesgo.
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PRECAUCIONES
GENERALES**

Se debe evitar el uso de antibióticos u otras sustancias antibacterianas de acción sistémica desde los 7 días antes de la vacunación hasta los 14 días después de la vacunación.

Disposición de residuos de acuerdo con la normativa nacional.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

CONTRAINDICACIONES

No vacunar aves enfermas

No vacunar ponedoras y reproductoras en las dos semanas anteriores a la postura y durante dicho periodo.

ADVERTENCIAS

Utilizar la vacuna inmediatamente después de reconstituida. Utilizar solo el diluyente indicado para administración subcutánea.

La vacunación debe llevarse a cabo al menos dos semanas antes que las aves sean transferidas al área de producción.

Los elementos usados para su administración, deben encontrarse libres de residuos de desinfectantes.

Una protección satisfactoria, solo se puede lograr en aves sanas.

Todas las aves de un mismo conjunto deberán ser vacunadas al mismo tiempo.

Realizar la vacunación en el momento del día en que se registre la menor temperatura ambiental.

Envases abiertos y vacíos, con remanentes y jeringas, utilizadas para la reconstitución de la vacuna deberán ser desinfectadas y descartadas inmediatamente dentro de los contenedores adecuados.

Seguir las especificaciones locales, regionales o nacionales respecto al descarte del material utilizado.

Medidas adicionales de bioseguridad deberán ser adoptadas en caso de exposición.

La vacunación no reemplaza un buen manejo nutricional, de higiene y de bioseguridad.

En caso de inoculación accidental del operario, podría producirse una reacción local. Se requiere de atención médica inmediata.

El almacenamiento o manejo impropio de la vacuna puede determinar pérdida de su potencia

ALMACENAMIENTO

Entre 2°C y 8°C, Proteger de la luz

PRESENTACIÓN

Viales con 500, 1000, 2000 y 2500 dosis



Producido por:

Ceva Saúde Animal Ltda.

Rua Dr. Elton César 121 – Chácara Campos dos Amarais – Campinas/Sp
Brasil

Importado y Distribuido por:

En Ecuador: Representado por Rebexa S.A.

El Calzado Calle S12 No. OE2-495 y Calle OE2L – Quito.

Reg. No.: 4A-14362-AGROCALIDAD

En Perú: Ceva Salud Animal S.A.C., Calle José Gonzales 681, Miraflores, Lima.

Reg. SENASA No.: B.01.9.01.I.0984