



# cevac CORYMUNE 7K

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

## Vacuna inactivada en emulsión oleosa


Para la inmunización de aves contra la Coriza Infecciosa, Salmonelosis, Newcastle, Bronquitis Infecciosa y Síndrome de Baja Postura

Reg. SAGARPA: B-7378-105  
**USO VETERINARIO**



### Fórmula

**CEVAC® CORYMUNE 7K** es una vacuna inactivada en emulsión oleosa. Se recomienda para la inmunización en aves contra la Coriza Infecciosa, provocada por *Avibacterium paragallinarum* (Serotipos A, B y C) e infecciones causadas por *Salmonella enteritidis*, la enfermedad de Newcastle cepa LaSota, la Bronquitis Infecciosa cepa M-41 y el Síndrome de Baja Postura cepa B8/78 homogeneizada con adyuvante oleoso y Merthiolate como conservador.



### Indicaciones

**CEVAC® CORYMUNE 7K** se recomienda para la inmunización activa de lotes de aves de postura y reproductoras entre 14-18 semanas de edad, contra la Coriza Infecciosa, Salmonelosis, enfermedad de Newcastle, Bronquitis Infecciosa y Síndrome de Baja Postura.

Las aves deben estar previamente inmunizadas con vacunas vivas contra la enfermedad de Newcastle y Bronquitis Infecciosa, y de 4 a 6 semanas antes, con una vacuna inactivada contra Coriza Infecciosa y de *Salmonella enteritidis*.



### Administración y dosis

La vacuna se puede aplicar por vía subcutánea o intramuscular a una dosis de 0.5 ml por ave:

- Subcutánea, en la piel laxa de la parte dorsal del tercio medio del cuello.
- Intramuscular, en la pechuga.



### Advertencias

- Almacenar la vacuna en refrigeración a una temperatura de entre 2 - 8°C.
- Proteger de la luz.
- No congelar el producto.
- La vacuna debe atemperarse de 25 a 30 °C antes de ser utilizada.
- Agitar el producto antes y durante su uso.
- Una vez reconstituida la vacuna, utilizar totalmente el contenido de los frascos.
- Incinerar el envase y todo el contenido no utilizado.
- Esta vacuna debe ser inyectada bajo condiciones estériles únicamente a animales sanos.
- No mezclar la vacuna con otras vacunas o con otros productos farmacéuticos.
- Si la vacuna se inyecta accidentalmente al operador, se requerirá de atención médica urgente.



## Presentación

- Frascos de 1000 dosis en 500 ml.
- Cajas conteniendo 5 x 1000 dosis.

### OFICINAS

Av. Periférico Sur No. 4829, Int. 301  
Col. Parque del Pedregal, C.P. 14010  
Del. Tlalpan, México, D.F.  
Tel.: 52 (55) 5362 1800  
CSA-940420591  
www.ceva.com.mx

### PLANTA INDUSTRIAL

Calle 54 Sur Lote 3-1 Mz. 15  
Col. CIVAC, C.P. 62500  
Jiutepec, Morelos, México  
Tel.: 52 (777) 516 7641  
Tel.: 52 (777) 516 9523  
Fax.: 52 (777) 516 9523



**USO VETERINARIO**

