

# CIRCOVAC®

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

## Vacuna inactivada

Para la inmunización contra Circovirus Porcino tipo 2 con adyuvante oleoso

Reg. SAGARPA: B-6407-114  
USO VETERINARIO



### Fórmula

#### Cada mililitro (ml.) del producto reconstituido contiene:

Principio activo: Circovirus Porcino Tipo 2 Inactivado a una concentración mayor ó igual a  $1.8 \log_{10}$  Unidades ELISA. Excipiente Thimerosal. Adyuvante: Aceite ligero de parafina.



### Indicaciones

**CIRCOVAC®** es una vacuna líquida inactivada en adyuvante oleoso, indicada para la inmunización activa o pasiva de lechones con el objetivo de reducir en estos la infección, excreción viral, lesiones y síntomas clínicos causados por el Circovirus porcino tipo 2 (PCV-2), agente del SDML (Síndrome del Desgaste Multisistémico Porcino).



### Administración y dosis

**VIA DE ADMINISTRACION:** Mezclar el contenido del frasco de **CIRCOVAC®** Suspensión con el contenido del frasco de **CIRCOVAC®** Emulsión. Aplicar por vía intramuscular profunda, de acuerdo con el siguiente esquema de vacunación:

**Lechones:**  
Administrar una dosis única de 0.5 ml. a partir de la 3a ó 4a semana de edad. La revacunación no es requerida. Vacune solo lechones de madres no vacunadas.

**Cerdas:**  
Primovacuna - Dos dosis de 2.0 ml. c/u con 3-4 semanas de intervalo, por lo menos, 2 semanas antes del apareamiento. Revacunación -Una dosis de 2.0 ml en cada gestación en 3 esquemas; antes de la IA al destetar a la hembra, vacunación general a todo el hato excepto cerdas que se acaban de inseminar o una dosis 2-4 semanas antes del parto.



### Advertencias

- La vacuna puede provocar un edema pasajero y una ligera reacción local sin ningún efecto en la salud y reproducción de los animales; si existiera hipersensibilidad aplicar tratamiento sintomático.
- Puede ser utilizado durante la gestación.
- El producto deberá conservarse en refrigeración entre 2 - 8 °C.
- Proteger de la luz solar.
- Este producto contiene adyuvante a base de aceite, la inyección accidental en humanos podría causar una reacción local severa, busque atención médica urgente.



## Presentación

- 50 ml.

Elaborado por: Merial, Francia  
Importado y distribuido por: Ceva Salud Animal, S.A. de C.V.  
Av. Periférico Sur No. 4829, Int. 301, Col. Parque del Pedregal, C.P. 14010  
Del. Tlalpan, Ciudad de México • Tel: 52 (55) 5362 1800 • CSA-940420591  
[www.ceva.com.mx](http://www.ceva.com.mx)



USO VETERINARIO

