

Vacuna viva, congelada de complejo inmune para la inmunización activa de pollitas de reemplazo de postura, contra la enfermedad de Gumboro

**COMPOSICIÓN**

Cada dosis contiene:

Virus Bursitis Infecciosa, Cepa SYZA 26 ..... mín 2.3 log<sub>10</sub> DIE50  
 En complejo con anticuerpos contra IBD ..... max 2.5 log<sub>10</sub> unidad AB  
 Excipientes c.s.p. .... 1 dosis

**ESPECIE DESTINO**

Aves

**INDICACIONES**

Para la inmunización activa de pollitas de reemplazo de postura, con el fin de reducir la mortalidad, los signos clínicos, las lesiones agudas de la Bolsa de Fabricio y para prevenir la excreción de virus provocados por las cepas clásicas y muy virulentas del virus de la infección de la Bolsa de Fabricio.

El inicio de la inmunidad se espera a partir de la 4ª semana después de la vacunación, dependiendo del nivel inicial de anticuerpos de origen materno (MDA, por sus siglas en inglés).

La duración de la inmunidad se demostró hasta 9 semanas después de la vacunación.

**ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN**

Se aplica una inyección de 0.2 ml por pollo, una sola vez, a la edad de un día.

La vacuna debe ser administrada por inyección subcutánea bajo la piel del cuello, mediante un dispositivo de inyección automático o manual.

| Presentación de la ampolla de la vacuna (No. de ampollas de vacuna multiplicadas por las dosis requeridas) | Presentación del diluyente (ml) | Volumen de una dosis (ml) |
|--|---------------------------------|---------------------------|
| 1 x 1000   | 200                             | 0.2                       |
| 5 x 1000   | 1000                            | 0.2                       |
| 1 x 2000   | 400                             | 0.2                       |
| 2 x 2000   | 800                             | 0.2                       |

Se deben aplicar las precauciones asépticas normales.

Los usuarios deben familiarizarse con todas las medidas de seguridad y de precaución para la manipulación de nitrógeno líquido, con el fin de evitar lesiones personales.

**Método de preparación de la suspensión de la vacuna:**

- Después de ajustar la cantidad de dosis de la vacuna con la cantidad de diluyente, retire rápidamente del tanque dewar con nitrógeno líquido, el número exacto de ampollas necesarias.
- Tome 2 ml del diluyente con una jeringa de 5 ml (en caso de una ampolla de 2ml) o 5 ml de diluyente con una jeringa de 10ml, (en caso de una ampolla de 5 ml). Use agujas calibre 18 por lo menos.

3. Descongele rápidamente el contenido de las ampollitas mediante agitación suave, en agua a 27-39°C.
4. Tan pronto como se hayan descongelado por completo, abra las ampollitas sosteniéndolas a una distancia de un brazo, con el fin de prevenir cualquier riesgo de lesión en caso de ruptura de la ampollita.
5. Una vez que la ampollita se encuentre abierta, extraiga el contenido con una jeringa estéril que ya contenga diluyente (ver punto 2.)
6. Transfiera la suspensión a la bolsa del diluyente y mezcle lentamente el envase de 5 a 6 veces.
7. Enjuague la ampollita una o dos veces con la vacuna diluida.

Repita las operaciones de los puntos 2-6 para el número adecuado de ampollitas a ser descongeladas.

La vacuna diluida, prepara como se describió, se mezcla mediante agitación suave para que este lista para usarse. Use la vacuna dentro de un máximo de 2 horas.

#### ADVERTENCIAS/

#### PRECAUCIONES GENERALES

Se puede obtener una protección satisfactoria sólo en aves saludables.

Todas las aves de la parvaada deben ser vacunadas al mismo tiempo.

No vacune pollitas de parvadas parentales no vacunadas o que no tengan MDA contra el virus de la IBD.

#### No use en aves de postura

Un almacenamiento o un manejo inadecuados de la vacuna, puede dar como resultado la pérdida de la potencia.

Deseche todos los envases abiertos de la vacuna, sobrantes de la vacunación, siguiendo las exigencias locales.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

#### ALMACENAMIENTO

Almacene y transporte en nitrógeno líquido

No vuelva a congelar la vacuna

#### PRESENTACIÓN

1000 y 2000 dosis

El número de dosis por ampollita se presenta en una etiqueta de color; adjunta a cada pajilla que contiene las ampollitas.



**USO VETERINARIO**



**Distribuido por:**



San Francisco N39-145 y Av. América  
Quito - Ecuador  
Teléfono: (593) 2 2275927 Móvil: (593) 99 931 6651  
E-mail: servicioalcliente@dimune.com  
www.dimune.com