

Especificaciones de producto

COYDEN[®] 25% PREMEZCLA (Clopidol)



Descripción:

Coyden[®] 25% contiene como principio activo 3,5-dicloro-2,6-dimetil-4-Piridinol (Clopidol), el cual es efectivo para el control de la coccidiosis causada por *E. acevulina*, *E. maxima*, *E. tenella*, *E. necatrix*, *E. brunetti*, *E. mitis* y *E. praecox* en pollos de engorda y pollitas de reemplazo.

Composición:

La premezcla contiene 25g de Clopidol y c.b.p 100 g de vehículo

Dosis y administración:

Especie	Contenido mínimo y máximo de Clopidol en el alimento (ppm)	Cantidad de Coyden [®] incorporada en el alimento (g/ton)	Edad máxima	Periodo de retiro
Pollos de engorda	125	500	-	5 días
Pollitas de reemplazo	125	500	Semanas	5 días

Instrucciones de mezclado:

Para asegurarse de una correcta homogenización, incorporar Coyden[®] 25% en una premezcla antes de agregarlo en el alimento.

Contraindicaciones:

No administrar en gallinas de postura, o pollitas de reemplazo después de 16 semanas. Coyden[®] 25% no deberá ser mezclado o usado simultáneamente con otro producto con efecto similar.

Apariencia:

Mezcla beige a marrón

Estabilidad y almacenamiento:

Almacene en empaque original, cerrado y protegido de la luz solar, en un lugar fresco y seco a una temperatura menor de 25°C. El producto tiene una caducidad de 2 años después de la fecha de fabricación. Coyden[®] 25% es estable en las condiciones normales de producción de alimentos (Peletizado, extrusión o expansión) Este producto permanece estable durante 3 meses en alimentos terminados y 6 meses en premezclas.

