

HydroDoxx[®] 500 mg/g



Composición

Cada gramo contiene 500 mg de Hiclato de Doxiciclina.

Presentación farmacéutica

Polvo soluble, para uso en agua de bebida.
Polvo amarillo.

Especies objetivos

Cerdos, pollos.

Indicaciones

Cerdos:

• Tratamiento y control de infecciones respiratorias causadas por Pasteurella multocida. 10 mg de Doxiciclina por kg de peso vivo por día durante 5 días.

Aves:

• Tratamiento y metafilaxia de enfermedad respiratoria crónica complicada causada por Mycoplasma gallisepticum 20 mg de Doxiciclina por kg de peso vivo por día durante 3 a 5 días.

Dosis y administración práctica

$$\frac{\text{Dosis diaria en mg/kg de peso vivo} \times \text{peso promedio (kg)}}{\text{Consumo promedio de agua (l/animal)}} = \text{mg de producto por litro de agua}$$

Tiempo de retiro

Cerdos (carne y vísceras): 6 días.

Aves (carne y vísceras): 6 días.

Caducidad

La caducidad del producto conservado en su envase original es de 3 años.

La caducidad del producto una vez diluido o reconstituido será de 24 horas.

Empaque

Bolsa sellada al calor de 1 kg, compuesta de polietileno tereftalato, aluminio y polietileno de baja densidad.



HydroDoxx[®] 500 mg/g

