


# Monimax® (monensin/nicarbazin)



## Descripción:

Es un coccidiostato que contiene los ingredientes activos monensina y nicarbazina. La fuerza combinada de la monensina ionófora y la nicarbazina química apuntan a un nuevo y único producto en el control de la coccidiosis. Monimax® es efectivo contra la coccidiosis causada por *Eimeria tenella*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. necatrix*, *E. mitis* y *E. praecox* afectando pollos engorde y pollos criados para la puesta y contra *E. gallopavonis*, *E. meleagridis*, *E. dispersa*, *E. adenoeides* y *E. meleagrimitis* afectando a pavos.

## Composición :

Cada kilogramo contiene una combinación de monensina sódica (equivalente a 80g de monensina activa) y Nicarbazina (equivalente a 80g de nicarbazina)

## Dosis y administración:

Especies objetivo	Contenido Mínimo y máximo de Monensina/nicarbazina en alimento completo (ppm)	Cantidad mínima y máxima de Monimax® incorporado en el alimento (g por ton)	máxima	Tiempo de retiro
Pollos engorde	40-50	500-625	-	Por favor revise su registro local
Pollitas para la cría	40-50	500-625	16 Semanas	
Pavos	40-50	500-625	16 Semanas	

## Instrucciones de mezclado:

Los microgránulos de Monimax® deben ser mezclados con otros ingredientes antes de la alimentación, con el fin de obtener una homogeneidad máxima y evitar segregación. El equipo de mezclado y transporte debe ser limpiado apropiadamente para evitar el arrastre.

## Características evaluadas:

Parámetros	Limites
Contenido de monensina, µg/mg	Desde 76.0 a 84.0
Contenido de nicarbazina, µg/mg	Desde 76.0 a 84.0
<i>Salmonella</i> , cfu/25 g	Ausente
Arsenico*, mg/kg	No mayor a 2.0
Plomo*, mg/kg	No mayor a 10.0
Cadmio*, mg/kg	No mayor a 1.0
Aflatoxina b1*, mg/kg	No mayor a 0.02

\*Relativo a un producto con contenido de humedad del 12%

## Contraindicaciones:

Peligroso para equinos. Este aditivo contiene un ionóforo. Evite su administración simultánea con tiamulina y monitoree por posibles reacciones adversas con otras sustancias médicas. No administre a pollitas criadas para la puesta de más de 16 semanas de edad. No alimentar a los animales sin diluir previamente el producto.

## Provisiones adicionales:

Aves de corral no deberían ser tratadas con tiamulina por al menos siete días antes o después de recibir alimento con Monimax.®.

## Apariencia :

Gránulos de color verde marroón

## Almacenaje y estabilidad:

En el paquete original, bien cerrado, en instalaciones bien ventiladas y protegido de la luz solar.

La fecha de expiración es en 2 años desde la fecha de manufactura. No se espera ninguna influencia debido a la granulación. El producto permanecerá estable en el alimento completo por 3 meses y en premezcla por un periodo de 6 meses.

Monimax® (monensin/nicarbazin)

PDS.Monimax.0114.EN001

