

Tilmovet®

Solucion Oral 25%
(Tilmicosina)



La mejor opción
para las infecciones
respiratorias





COMPOSICIÓN

Contenido	TILMOVET® 25% Solución Oral
Tilmicosin Fosfato equivalente a tilmicosina)	250 mg
Excipientes	hasta 1 ml

ACCIÓN FARMACOLÓGICA

Tilmicosina, (20 - desoxo - 20 - (3,5 - dimetilpiperidin - 1 -il) - desmicosina) es un antibiótico macrólido químicamente modificado de larga acción aplicado en la medicina veterinaria. Es activo principalmente contra Gram-positivos, algunos microorganismos Gram-negativos (*estreptococos*, *estafilococos*, *Pasteurella spp.* y *Micoplasmas spp.*), etc aplicado por vía oral en pollos, tilmicosina alcanza niveles máximo en sangre después de 3 horas y mantiene concentraciones terapéuticas altas en los tejidos-objetivo. Es concentrado en los pulmones, penetrando intracelularmente en los macrófagos alveolares. Se elimina principalmente a través de las heces y la orina. La Tilmicosina no induce ningún efecto teratogénico y embriotóxico.

INDICACIONES

Para la prevención (metafilaxis) y el tratamiento de enfermedades respiratorias bacterianas en las aves de corral causada por *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Ornithobacterium rhinotracheale*, *Pasteurella multocida* y otros microorganismos sensibles a la tilmicosina.

CONTRAINDICACIONES

No se debe dar acceso al agua medicinal que contiene tilmicosina a los caballos y otros equinos.
No administrar a las ponedoras de los cuales su producción están destinados al consumo humano.

MODO DE ADMINISTRACIÓN

Por vía oral, en el agua potable como el único líquido para beber. Prepare agua medicada fresca cada 24 horas.

ESPECIES DE DESTINO

Pollos de engorde, crecimiento y manadas.

DOSIS

La dosis diaria promedio es de 15-20 mg/ kg b.w.

Pollos de engorde

0,3 ml/ l de agua (= 75 mg de tilmicosina/ l) durante los primeros 3 días después de la eclosión.

Crecimiento y engorde

En los casos de micoplasmosis diagnosticada: 0,3 ml/ l de agua (= 75 mg de tilmicosina/ l) durante 3 días cada mes.

EFFECTOS SECUNDARIOS

No se ha establecido

PERIODO DE RETIRO

Para carne - 12 días después de la última administración

ALMACENAMIENTO

En el envase original, bien cerrado, en lugar seco y bien ventilado, protegido de la luz directa del sol.

PRECAUCIÓN

Las personas que manipulan el producto deben usar dispositivos de protección personal como guantes de protección de impermeables de goma y gafas de seguridad y / o careta.

No comer ni fumar en el área de almacenaje de materiales.
Lávese las manos con jabón antes de comer o fumar.

ENVASE

Botellas plásticas de 60 ml,
240 ml o 960 ml



Tilmovet®