



Vacuna inactivada en emulsión oleosa para la inmunización contra Coriza Infecciosa, *Salmonella* Enteritidis, Enfermedad de Newcastle, Bronquitis Infecciosa y Síndrome de Baja Postura (EDS)

COMPOSICIÓN

Cada dosis de 0.5 ml contiene:

Avibacterium paragallinarum serotipo A $\geq 10^{7.0}$ UFC

Avibacterium paragallinarum serotipo B $\geq 10^{7.0}$ UFC

Avibacterium paragallinarum serotipo C $\geq 10^{7.0}$ UFC

Salmonella Enteritidis $\geq 2^{4.0}$ MAT

Virus de la Enfermedad de Newcastle Cepa SZ, La Sota ≥ 50 PD₅₀

Virus de Bronquitis Infecciosa cepa Massachusetts, M41 $\geq 2 \times 10^6$ HI

Virus de EDS cepa B8/78 $\geq 2 \times 10^7$ HI

Excipientes c.s.p. 1 dosis

Preservante: Timerosal

Adyuvante oleoso

ESPECIE DESTINO

Aves de postura y reproductoras

INDICACIONES

CEVAC® CORYMUNE 7 K se recomienda para la inmunización activa de lotes de aves de postura y reproductoras contra la Coriza Infecciosa causada por *Avibacterium paragallinarum*, *Salmonella* Enteritidis. Enfermedad de Newcastle, Bronquitis Infecciosa y Síndrome de Baja Postura.

Las aves deben haber sido previamente inmunizadas con vacunas vivas contra la Enfermedad de Newcastle y Bronquitis Infecciosa y, de 4 a 6 semanas antes, con una vacuna inactivada contra Coriza Infecciosa y *Salmonella* Enteritidis.

**ADMINISTRACIÓN Y
DOSIFICACIÓN**

CEVAC® CORYMUNE 7 K debe administrarse a lotes de aves de postura y reproductoras entre 14-18 semanas de edad, 2 a 4 semanas antes del comienzo de la producción de huevos.

La vacuna debe ser inyectada por vía subcutánea (bajo la piel del cuello) o intramuscular (en la pechuga o en el muslo) en dosis de 0.5 ml por ave.

**PRECAUCIONES
GENERALES**

Solamente en aves sanas y bien desarrolladas puede obtenerse protección satisfactoria. Se debe utilizar equipo de inyección estéril. Agitar suficientemente el frasco antes del uso. Verificar la exactitud de la jeringa para garantizar la administración de la dosis indicada. Una vez abierto el frasco, utilizar inmediatamente y en su totalidad.
Disposición de residuos de acuerdo con la normativa nacional.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

ADVERTENCIAS No mezclar la vacuna con otras vacunas u otros medicamentos.
Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata.

ALMACENAMIENTO Entre 2°C y 8°C, protegida de la luz.
No congelar

PRESENTACIÓN Viales con 500, 1000 y 3000 dosis



Producido por:

Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.
1107 Budapest, Szállás U.5., Budapest
Hungría

Importado y Distribuido por:

En Argentina: Ceva Santé Animale S.A. Sucursal Argentina.
Inscripto No. 12238 – Perú 1655 (C1141ACI)- Buenos Aires.
SENASA Certificado No. 10-224

En Bolivia: Agroservet S.R.L., Santa Cruz. Reg. SENASAG No. 004935/12

En Colombia: Ceva Salud Animal S.A.S., Bogotá. Reg ICA: 7607-BV

En Ecuador: Representado por Rebexa S.A.
El Calzado Calle S12 No. OE2-495 y Calle OE2L – Quito.
Reg. No.: 4A-4C-12314-AGROCALIDAD

En Perú: Ceva Salud Animal S.A.C., Calle José Gonzales 681, Miraflores, Lima.
Reg. SENASA No.: B.01.4.01.I.10913

En Venezuela: Productos Swissagro C.A., Caracas, RIF J-303108741
Reg. MAT-SASA No. B.I. 12.906 Asesor técnico: M.V. Ana Rosa Guerra