

USO VETERINARIO · VENTA BAJO FÓRMULA DEL MÉDICO VETERINARIO

Amoxicilina 15%. Suspensión inyectable

COMPOSICIÓN	Cada 100ml contienen: Amoxicilina (como Trihidrato) 15 g Excipientes c.s.p. 100 ml
ESPECIE DESTINO	Bovinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos
INDICACIONES	En rumiantes para el tratamiento de infecciones respiratorias causadas por <i>Mannheimia haemolytica</i> y <i>Pasteurella multocida</i> . En porcinos para el tratamiento de infecciones respiratorias causadas por <i>Pasteurella multocida</i> .
ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICIÓN	Vía intramuscular. Agitar antes de usar. Dosis: 15 mg de amoxicilina/kg de peso (1 ml de VETRIMOXIN® L.A. para 10 kg de peso) La dosis puede repetirse 48 horas después, si es necesario.
CONTRAINDICACIONES	No administrar a animales sensibles a penicilinas. No administrar a conejos ni roedores.
PRECAUCIONES ESPECIALES	No administrar por sitio de inyección más de 20 ml de producto en rumiantes ni más de 6 ml en porcinos. Disposición de residuos de acuerdo con la normativa local y nacional. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos
PERIODO DE RETIRO	Los bovinos, ovinos y caprinos tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 18 días después de finalizado el tratamiento. Los porcinos tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 8 días después de finalizado el tratamiento. La leche de la vaca producida durante el tratamiento y 72 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano. No administrar a ovejas y cabras cuya leche se destine al consumo humano.
ALMACENAMIENTO	Almacenar entre 15°C y 30°C al abrigo de la luz solar. Una vez abierto el envase, el producto se puede conservar durante un máximo de 28 días, a una temperatura no mayor a 25°C
PRESENTACIÓN	Frasco x 50, 100, 250 y 500 ml