

CIRBLOC M HYO



USO VETERINARIO · VENTA BAJO FÓRMULA DEL MÉDICO VETERINARIO

Emulsión inyectable para la inmunización activa de cerdos a partir de las 3 semanas de edad, contra *Mycoplasma hyopneumoniae* y la infección por Circovirus porcino tipo 2 (PCV2)

COMPOSICIÓN

Cada dosis contiene:

Mycoplasma hyopneumoniae inactivado, cepa 2940 mín. 184 UA*
Circovirus porcino tipo 2d, proteína de cápside ORF2** mín. 19.6 mcg

*UA: Unidades de antígeno medido en prueba de potencia (ELISA)

**El antígeno recombinante de circovirus porcino tipo 2d (proteína de la cápside ORF2) se autoensambla en partículas similares al virus (VLPs, por sus siglas en inglés virus-like particles)

ESPECIE DESTINO

Porcinos (cerdos para engorde)

INDICACIONES

Para la inmunización activa de cerdos para reducir:

- la viremia, la carga viral en pulmones y tejidos linfoides y la excreción del virus causada por la infección por circovirus porcino tipo 2 (PCV2),
- la gravedad de las lesiones pulmonares causadas por la infección por *Mycoplasma hyopneumoniae*,
- la pérdida en la ganancia de peso corporal.

Establecimiento de la inmunidad:

PCV2: 2 semanas después de la vacunación

M. hyopneumoniae: 3 semanas después de la vacunación

Duración de la inmunidad:

PCV2: 23 semanas después de la vacunación

M. hyopneumoniae: 23 semanas después de la vacunación

ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN

Dosis: 2 mL

La vacuna debe ser administrada por vía intramuscular en el cuello. Una sola dosis de 2ml, en cerdos a partir de las 3 semanas de edad.

Permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente (15°C - 30°C)

Agite bien antes de su uso.

Aplique los procedimientos asépticos habituales.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Al usuario: Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. Su inyección accidental/autoinyección puede provocar dolor agudo e inflamación, en particular si se inyecta en una articulación o un dedo, y en casos excepcionales podría provocar la pérdida del dedo afectado si no se proporciona atención médica urgente. En caso de inyectarse accidentalmente con este medicamento veterinario consulte urgentemente con un médico, incluso si solo se ha inyectado una cantidad muy pequeña, y lleve el prospecto consigo. Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen médico, diríjase de nuevo a un facultativo.

Al facultativo: Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. Incluso si se han inyectado pequeñas cantidades, la inyección accidental de este medicamento veterinario puede causar inflamación intensa, que podría, por ejemplo, terminar en necrosis isquémica e incluso la pérdida del dedo. Es necesaria atención médica experta INMEDIATA, a cargo de un cirujano dado que pudiera ser necesario practicar inmediatamente una incisión e irrigar la zona de inyección, especialmente si están afectados los tejidos blandos del dedo o tendón.

CONTRAINDICACIONES Desconocidas.

ADVERTENCIAS Vacunar únicamente animales sanos.
En granjas donde la vacunación de cerdas y primerizas contra PCV2 y *M. hyopneumoniae* se realiza durante el final de la gestación y se pueden esperar altos niveles de MDA, el uso de Cirbloc M Hyo puede retrasarse.
No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento durante la gestación o lactancia.

REACCIONES ADVERSAS Cerdos de engorde:

Muy frecuentes (>1 animal por cada 10 animales tratados):

- Hinchazón en el punto de inyección: Pueden producirse hinchazones de 0.2 cm a 2 cm cuando la administración se realiza con un inyector masivo; desaparecen espontáneamente en nueve días.

- Temperatura elevada y letargia: Puede producirse letargia y aumento de la temperatura corporal cuatro horas después de la vacunación con un máximo de 1.7 °C a nivel individual y 0.5 - 0.78 °C como promedio, que se resuelven espontáneamente al día siguiente.

La notificación de acontecimientos adversos es importante. Permite la vigilancia continua de la seguridad de un medicamento veterinario.

ALMACENAMIENTO Conservar y transportar refrigerado (entre 2°C y 8°C); proteger de la luz; no congelar.

PRESENTACIÓN Frascos de polietileno de baja densidad de 50, 100, 250 o 500ml sellados con tapón de goma y cápsula de aluminio



DIMUNE S.A. - www.dimune.com
Av. Orellana E9-195 y Av. 6 de Diciembre,
Edificio Alisal de Orellana, Oficina 1101, Quito - Ecuador
Telfs: 593-22563-034 / 593-22566-170



Producido por:
Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd
1107 Budapest, Szállás u. 5 Hungría